



**COMPLIANCE TRAINING**  
**ONLINE.com**

## **Cal/OSHA, DOT HAZMAT, EEOC, EPA, HIPAA, IATA, IMDG, TDG, MSHA, OSHA, Australia WHS, and Canada OHS Regulations and Safety Online Training**

This document is provided as a training aid  
and may not reflect current laws and regulations.

Be sure and consult with the appropriate governing agencies  
or publication providers listed in the "Resources" section of our website.

[www.ComplianceTrainingOnline.com](http://www.ComplianceTrainingOnline.com)



[Facebook](#)



[LinkedIn](#)



[Twitter](#)



[Google Plus](#)



[Website](#)

## ¡Protéjase! Los trabajadores pueden estar expuestos a **Araña reclusa marrón**

La araña reclusa marrón es del grupo de las arañas llamado comúnmente violinistas. La forma característica del dibujo del violín está ubicada en lo alto de la región donde la pierna conecta al cuerpo (cephalothorax). Porque es retirado y retraído, como su nombre describe, la Araña reclusa marrón se evade de los espacios abiertos. La araña es peligrosa y puede picar e inyectar el veneno tóxico.

### Identificación

- El tamaño del cuerpo: 1/4 a 3/4 de la pulgada (6.4-19.1 mm)
- Color: Marrón dorado
- Una forma oscura del violín (vea la foto primera) está ubicada en lo alto de la región donde la pierna conecta al cuerpo (cephalothorax) con el cuello del violín en la dirección hacia atrás al abdomen.
- A diferencia de la mayoría de arañas que tiene 8 ojos, la Araña reclusa marrón reclusa tiene 6 ojos. Los ojos, organizados en los pares—un par está adelante y un par está en cada lado—pueden ser visto fácilmente debajo de la magnificación baja.



Photo: R. Bessin, University of Kentucky



Photo: creatures.ifas.ufl.edu

### Hábitat

La Araña reclusa marrón construye las telarañas pequeñas detrás de los objetos de cualquier tipo.

### Síntomas

- La severidad de la mordedura puede variar. Los síntomas pueden variar de ninguna a muy severas.
- Generalmente la mordedura enrojece después de varias horas.
- A menudo hay una reacción sistemática dentro de 24-36 horas caracterizada por la inquietud, la

fiebre, los frecos, la náusea, la debilidad y el dolor de las articulaciones.

- El tejido al sitio de la mordedura y del espacio circundante muere y muda eventualmente.

### Protección

- Se lleva una camisa de manga larga, un sombrero, los guantes, y las botas cuando se maneje las cajas reservadas, la leña, los maderos y las piedras, etc.
- Se inspecciona y se sacude la ropa y los zapatos antes de llevarse.
- Se usa los antiinsectos, como DEET o Picaridin, en la ropa y los zapatos.

### Tratamiento

- Se lava la área de la mordedura con el jabón y agua.
- Se aplica hielo a la mordedura para reducir la absorción del veneno.
- Se eleva e inmoviliza la extremidad picada.
- Se captura la araña, si posible, para el propósito de la identificación.
- Se busca atención médica.

Este texto forma parte de una serie de hojas informativas que enfocan programas, políticas o normas de OSHA y no impone ningún requisito de cumplimiento nuevo. Para obtener una lista completa de los requisitos de cumplimiento de las normas y de los reglamentos de OSHA, consulte el título 29 del Código de Reglamentos Federales. El teléfono de voz es (202) 693-1999; teleimpresor (TTY) número: (877) 889-5627.

Para información más completa:



Departamento del Trabajo de Estados Unidos

[www.osha.gov](http://www.osha.gov)  
(800) 321-OSHA

DSG 07/2010